

Prospecto: información para el paciente

2LCHLA glóbulos

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, profesional sanitario o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, profesional sanitario o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora.

Contenido del prospecto

1. Qué es 2LCHLA glóbulos y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar 2LCHLA glóbulos
3. Cómo tomar 2LCHLA glóbulos
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de 2LCHLA glóbulos
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es 2LCHLA glóbulos y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas.

Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su seguridad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario antes de empezar a tomarlo y acuda al médico si los síntomas persisten.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar 2LCHLA glóbulos

No tome 2LCHLA glóbulos:

Si es alérgico a los principios activos o a alguno de los demás componentes de este medicamento incluidos en la sección 6.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar 2LCHLA glóbulos.

Si los síntomas persisten o se agravan durante la utilización de este medicamento, se deberá consultar con su médico o farmacéutico.

Toma de 2LCHLA glóbulos con otros medicamentos

No se han descrito interacciones con otros medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

Toma de 2LCHLA glóbulos con alimentos y bebidas

La toma del medicamento se hará siempre alejada de las comidas: 15 o 30 minutos antes de las comidas o una hora después, y dejando un espacio de tiempo entre las tomas.

Nota general: Se recomienda evitar la ingesta de alimentos estimulantes (menta, té, café, chocolate, etc.) en la hora que precede a la toma del medicamento.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

2LCHLA glóbulos contiene lactosa y sacarosa

Este medicamento contiene lactosa y sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

3. Cómo tomar 2LCHLA glóbulos



Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

La posología recomendada es de una cápsula al día por vía sublingual, respetando el orden numérico de las cápsulas. Ocasionalmente y por indicación médica, se incrementará el ritmo del tratamiento.


2LCHLA glóbulos se administra por vía sublingual abriendo la cápsula y vertiendo su contenido debajo de la lengua. Los glóbulos se mantienen debajo de la lengua hasta que se disuelven.

Se recomienda tomar el medicamento preferiblemente por la mañana en ayunas, 15 o 30 minutos antes del desayuno o, en caso de olvido, una hora después del mismo.

NO tragar la cápsula entera. Lea las instrucciones detenidamente:



1. Empiece con uno de los tres blisters de la caja.
2. Tome la cápsula siguiendo la numeración



3. Abra la cápsula cuidadosamente con la cabeza de la cápsula hacia arriba



4. Vierta su contenido debajo de la lengua y deje que se disuelva

Siga el orden numérico de las cápsulas indicado en el blíster. Al finalizar el primer blíster, continúe con la cápsula 1 del siguiente blíster y así hasta finalizar el tratamiento.

En el caso de que se haya tomado más 2LCHLA glóbulos del que debiera o en caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar 2LCHLA glóbulos

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si comete un error en el orden de las cápsulas, o si omite una cápsula, siga desde la última cápsula que tomó.

Si interrumpe el tratamiento con 2LCHLA glóbulos

No se esperan efectos adversos si interrumpe la toma de 2LCHLA glóbulos.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

No se conocen efectos adversos hasta la fecha, por lo que no puede estimarse una frecuencia a partir de los datos disponibles.

Tradicionalmente, el uso de medicamentos homeopáticos puede dar lugar temporalmente a una sensación de agravación de los síntomas, que suelen desaparecer después de unos días. Si los síntomas persisten, consulte con su médico, profesional sanitario o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (<http://www.notificaram.es>). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de 2LCHLA glóbulos

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si observa signos visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de 2LCHLA glóbulos

3 blíster de 10 cápsulas duras cada uno. Cada cápsula contiene:

<i>Cápsula 1:</i>	
<i>Interleucina 1: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Interleucina 2: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Interferón alfa: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA CHLA: 18 CH</i>	<i>0,0038ml</i>

<i>Cápsula 2:</i>	
<i>Interleucina 1: 9 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Interleucina 2: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Interferón alfa: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA CHLA: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>

<i>Cápsula 3:</i>	
<i>Interleucina 1: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Interleucina 2: 9 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Interferón alfa: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA CHLA: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>

<i>Cápsula 4:</i>	
<i>Interleucina 1: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Interleucina 2: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Interferón alfa: 9 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA CHLA: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>

<i>Cápsula 5:</i>	
<i>Interleucina 1: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Interleucina 2: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Interferón alfa: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>

Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 18 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA CHLA: 10 CH	0,0038ml

Cápsula 6:	
Interleucina 1: 10 CH	0,0038ml
Interleucina 2: 10 CH	0,0038ml
Interferón alfa: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA CHLA: 18 CH	0,0038ml

Cápsula 7:	
Interleucina 1: 9 CH	0,0038ml
Interleucina 2: 10 CH	0,0038ml
Interferón alfa: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA CHLA: 10 CH	0,0038ml

Cápsula 8:	
Interleucina 1: 10 CH	0,0038ml
Interleucina 2: 9 CH	0,0038ml
Interferón alfa: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA CHLA: 10 CH	0,0038ml

Cápsula 9:	
Interleucina 1: 10 CH	0,0038ml
Interleucina 2: 10 CH	0,0038ml
Interferón alfa: 9 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA CHLA: 10 CH	0,0038ml

Cápsula 10:	
Interleucina 1: 10 CH	0,0038ml
Interleucina 2: 10 CH	0,0038ml
Interferón alfa: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 18 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA CHLA: 10 CH	0,0038ml

Los demás componentes (excipientes) son lactosa y sacarosa.

Aspecto del producto y contenido del envase

2LCHLA glóbulos se presenta en forma de glóbulos acondicionados en cápsulas duras desechables, que son administrados por vía sublingual.

Acondicionamiento primario: cápsulas de gelatina dura.

Acondicionamiento secundario: estuche con 3 blísters de PVC/AL que contienen 10 cápsulas cada uno.

Titular de la autorización de comercialización:

Labo'Life España S.A.U.
Avinguda des Raiguer, 7
07330 Consell, Islas Baleares, España
Teléfono: + 34 971 14 20 35
Email: medicamentos@labolife.com

Fecha de la última revisión de este prospecto: 02/2023

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>).