

## **Prospecto: información para el paciente**

**Mezereum 5CH glóbulos**  
**Mezereum 6CH glóbulos**  
**Mezereum 7CH glóbulos**  
**Mezereum 9CH glóbulos**  
**Mezereum 15CH glóbulos**  
**Mezereum 30CH glóbulos**  
**Mezereum 200CH glóbulos**  
**Mezereum 200K glóbulos**  
**Mezereum 1.000K glóbulos**  
**Mezereum 10.000K glóbulos**  
**Mezereum 2LM glóbulos**  
**Mezereum 6LM glóbulos**  
**Mezereum 12LM glóbulos**

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en el prospecto. Ver sección 4.

### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Mezereum glóbulos y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Mezereum glóbulos.
3. Cómo tomar Mezereum glóbulos.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de Mezereum glóbulos.
6. Contenido del envase e información adicional.

### **1. Qué es Mezereum glóbulos y para qué se utiliza**

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario para su utilización y acuda al médico si los síntomas persisten.

### **2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Mezereum glóbulos**

**No tome Mezereum glóbulos** si es alérgico al Mezereum o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Mezereum glóbulos.

En caso de empeoramiento de los síntomas o si no se produjera mejoría después de 7 días de iniciar el tratamiento, se deberá consultar con el médico o farmacéutico.

### **Otros medicamentos y Mezereum glóbulos**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

### **Toma de Mezereum glóbulos con alimentos y bebidas**

Tomar Mezereum glóbulos preferiblemente separado de las comidas.

### **Embarazo, lactancia y fertilidad**

Si está embarazada, en periodo de lactancia o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

### **Conducción y uso de máquinas**

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

**Mezereum glóbulos contiene sacarosa (azúcar). Si su médico le ha indicado que padece alguna intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Puede perjudicar los dientes.**

## **3. Cómo tomar Mezereum glóbulos**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es de 3 glóbulos de 1 a 3 veces al día.

Mezereum glóbulos requiere una posología individualizada. Consultar con su farmacéutico o médico formado en homeopatía.

Vía sublingual

**En el caso de que haya tomado más Mezereum glóbulos del que debiera o en caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.**

### **Si olvidó tomar Mezereum glóbulos**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

## **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Si nota síntomas de alergia (hipersensibilidad), interrumpa la toma de Mezereum glóbulos.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad del medicamento.

### **5. Conservación de Mezereum glóbulos**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, después de “EXP”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si usted observa signos visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

### **6. Contenido del envase e información adicional**

#### **Composición de Mezereum glóbulos**

- El principio activo es Mezereum.  
Cada envase de 4 g corresponde a un producto terminado con una sola dilución de Mezereum.  
Cada glóbulo contiene 0,0004 g de Mezereum.
- Los demás componentes (excipientes) son 0,040 g de sacarosa por glóbulo.

#### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Son glóbulos, aproximadamente esféricos y blanquecinos.

Los glóbulos se acondicionan en 1 envase que contiene 4 g de glóbulos o 2 envases de 4 g de glóbulos cada uno.

Envase de polietileno de alta densidad con tapón y etiqueta que envuelve todo y asegura la inviolabilidad.

#### **Titular de la autorización de comercialización:**

IBERICA DE HOMEOPATIA S.L.  
C/ Juan José Lorente, 13-15  
50005 Zaragoza

#### **Responsable de la fabricación:**

IBERICA DE HOMEOPATIA S.L.  
C/ Juan José Lorente, 13-15  
50005 Zaragoza

Puede solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al titular de comercialización

**Fecha de la última revisión de este prospecto: Mayo 2022**

La información detallada de este medicamento está disponible en la pagina web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>