

Prospecto: información para el paciente

Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días.

Contenido del prospecto

1. Qué es Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución
3. Cómo tomar Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario para su utilización y acuda al médico si los síntomas persisten.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución

No tome Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución si es alérgico a las sustancias activas o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución.

En caso de empeoramiento de los síntomas o si no se produjera mejoría después de 7 días de iniciar el tratamiento, se deberá consultar con el médico o farmacéutico.

Niños y adolescentes

Debido a la falta de experiencia suficientemente documentada en niños $\geq$ de 6 años, el producto debe utilizarse tras consejo médico.

No se recomienda el uso de Dr. Reckweg R37 Colinteston gotas orales en solución en niños menores de 6 años.

Otros medicamentos y Dr. Reckweg R37 Colinteston gotas orales en solución

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

Toma de Dr. Reckweg R37 Colinteston gotas orales en solución con alimentos y bebidas

Tomar Dr. Reckweg R37 Colinteston gotas orales en solución preferiblemente separado de las comidas.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada, en periodo de lactancia o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas.

Dr. Reckweg R37 Colinteston gotas orales en solución contiene etanol (alcohol).

La cantidad se corresponde con 1,464 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento es equivalente a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino.

La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.

3. Cómo tomar Dr. Reckweg R37 Colinteston gotas orales en solución

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicados por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Vía oral

En estados agudos, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- niños $\geq$ de 12 años: 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

- niños 6 - 11 años: 3 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.

- niños menores de 6 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckweg R37 Colinteston gotas orales en solución.

Debido a la falta de experiencia suficientemente documentada en niños $\geq$ de 6 años, el producto debe utilizarse tras consejo médico.

Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución requiere una posología individualizada. Consultar con su farmacéutico o médico formado en homeopatía.

En el caso de que haya tomado más Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución del que debiera o en caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si nota síntomas de alergia (hipersensibilidad), interrumpa la toma de Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano <https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si usted observa signos visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución:

Los principios activos por cada 5 gotas son: Alumina D12 23,83 mg, Bryonia D6 23,83 mg, Colocynthis D6 23,83 mg, Lycopodium D6 23,83 mg, Nux vomica D6 23,83 mg, Sulfur D12 23,83 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V

Aspecto del producto y contenido del envase

Solución limpia y incolora.

Envase de vidrio de color topacio de 22 ml y 50 ml con gotero y tapón de rosca con anillo de seguridad.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Pharmazeutische Fabrik
Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32
D-64625 Bensheim
Alemania

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización:

Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Sucursal en España
Polígono Industrial Ugaldeguren1
48160 Derio (Vizcaya)
E-mail: reckeweg@lavigor.com
Fax: +34 944545143
Teléfono: +34 944545057

Fecha de la última revisión de este prospecto: Enero 2023

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>